



SICHERHEITS-TIPP

KÄRNTNER ZIVILSCHUTZVERBAND

WELCHE PILZE SIND UNGIFTIG, WELCHE GIFTIG?



Grüner Knollenblätterpilz
[Amanita phalloides]
bevorzugt Laubwälder,
tödlich giftig!!!



Eierschwamm, Pfifferling
[Cantharellus cibarius]
In Nadel- und Laubwäldern,
beliebter Speispilz.



Kirschroter Spei-Taubling
[Russula emetica]
bevorzugt Nadelwälder,
giftig, scharf schmeckend



Apfel-Taubling
[Russula paludosa]
bevorzugt Nadelwälder
(Kiefern), mild schmeckender
Speispilz.



Fliegenpilz
[Amanita muscaria]
Laub- und Nadelwälder
giftig! enthält ein Nier-



Kaiserling
[Amanita caesarea]
Laubwälder, wärmeliebend,
essbar, selten und



Karbol-Champignon
[Agaricus xanthoderma]
Gärten, Parks, Wald-
ränder, giftig!



Anis-Champignon
[Agaricus arvensis]
Wiesen, Weiden,
Waldränder, sehr guter



Riesen-Röhrling
[Entoloma sinuatum]
unter Laubbäumen,
sehr giftig!



Schild-Röhrling
[Entoloma clypeatum]
in Obstgärten,
Vorsicht u.U. Spritzmittel,
gut gekocht essbar



Lila Dickfuß
[Cortinarius iaganus]
in Nadelwäldern,
giftig



Reispilz, Zigeuner
[Rosettes caperatus]
in Fichtenwäldern,
guter Speispilz



Ziegeleer Risspilz
[Inocybe palauillardii]
in Laubwäldern, Parks,
sehr giftig!



Mai-Pilz, Mai-Ritterling
[Colocybe gambosa]
Parks, Waldlichtungen,
guter Speispilz, Mehl-
geruch



Gallen-Röhrling
[Lyopilus felleus]
in Laub- und Nadelwäldern,
ungenießbar weil
bitter



Steinpilz, Herrenpilz
[Boletus edulis]
in Nadelwäldern,
sehr guter Speispilz



Schön- (Dickfuß-) Röhrling
[Boletus calopus]
in Laub- und Nadelwäldern,
ungenießbar,
weil bitter



Reißfuß-Röhrling
[Rorococcus chrysanteron]
in Laub- und Nadelwäldern,
essbar, für
Mischgerichte



Kegelhütiger Knollenblätterpilz
[Amanita virosa]
Laub- und Nadelwälder,
tödlich giftig!



Anis-Champignon
[Agaricus arvensis]
Wiesen, Weiden,
Waldränder,
sehr guter Speispilz



Frühjahrs-Lorchel
[Cycromitra esculenta]
in Kiefernwäldern,
sehr giftig!



Speise-Morchel
[Morchella esculenta]
in Laubwäldern, Gärten,
geschätzter Speispilz



Pantherpilz
[Amanita pantherina]
Laub- und Nadelwälder,
sehr giftig!
enthält ein Nervengift



Perlpilz
[Amanita rubescens]
Laub- und Nadelwälder,
niemals roh verzehren!



Birken-Reizker
[Lactarius torminosus]
Birkenbegleiter,
giftig!
scharf schmeckend



Edel-Reizker
[Lactarius delicatulus]
Kiefernbegleiter,
guter Speispilz



Grauer Faltentintling
[Coprinus atramentarius]
Gärten, Parks, Wiesen
bedingt essbar (kein
Alkohol)



Schopf-Tintling
[Coprinus comatus]
Wiesen, Wegränder,
Ruderflächen,
jung essbar



Fleischlicher Schirmpilz
[Leptia helveola]
Parkanlagen, Laubbäume,
lebensbedrohend giftig!



Parasol, Riesen-Schirmling
[Macroleptia procera]
Wiesen, Laub- und
Nadelwälder, guter
Speispilz



Kahler Krempling
[Paxillus involutus]
unter Laub- und Nadelwäldern,
sehr giftig!
bewirkt Allergien



Kuhmaul, Großer Schmierling
[Gomphidius glutinosus]
in Fichtenwäldern, guter
Speispilz, schleimig



Grünblättriger Schwefelkopf
[Hypholoma fasciculare]
büschelig an Laub- u.
Nadelholz, sehr giftig!



Stochschwämmchen
[Kuehneromyces mutabilis]
in Laub- und Nadelwäldern,
guter Speispilz



Kartoffel-Bovist
[Scleroderma citrinum]
in Laub- und Nadelwäldern,
giftig!



Flaschen-Taubling
[Iyopendon perlatum]
in Laub- und Nadelwäldern,
essbar solange
weiß



Satanspilz
[Boletus satanas]
in Laubwäldern, bei
Buchen, giftig!
Magen-Darmerkrankungen



Flockenstieliger Hexenröhrling
[Boletus erythropus]
unter Laubbäumen (Buchen), giftig!
Verdauungsstörungen



Dreifarbige Koralle
[Ramaria formosa]
unter Laubbäumen (Buchen), giftig!
Verdauungsstörungen



Grünfeldräger Taubling
[Russula vitescens]
bevorzugt Laubwälder
sehr guter, mild schmeckender
Speispilz

(Grafik entnommen des Pilz-Ratgebers des Steirischen Zivilschutzverbandes und der Stadt Graz)